

ESPLUGABOUS

(*Bubulcus ibis*) Cast.: Garcilla bueyera

Com s'identifica?

De mida mitjana. Té el coll i les potes llargues, però menys que el martinet blanc. Fora del període reproductor el seu plomatge és blanc, les potes de color fosc i el bec de tons groguencs. En plomatge nupcial presenta tons ataronjats al bec, les potes i algunes plomes del cos. En vol porta el coll arreplegat i, per tant, dóna la sensació de ser un ocell menys allargat que quan es troba posat.

Quan el podem veure?

Durant tot l'any, però és més escàs d'abril a juliol.

On es veu?

Principalment als trams fluvials de la plana vallesana.

Comportament

Es troba normalment a la llera i als marges fluvials. Sovint segueixen ramats d'ovelles i, fins i tot, alguns individus s'aturen damunt d'elles. El pas de les ovelles provoca que es moguin insectes, ratolins o granotes, de manera que l'esplugabous descobreix amb més facilitat el seu aliment. Al capvespre es reuneixen en llocs tranquils per dormir, arribant a formar joques de centenars d'individus, com per exemple la que s'ubica a l'Hostal del fum.



Foto: Pere Tuset / Digital Natura

CAMES LLARGUES

(*Himantopus himantopus*) Cast.: Cigueñuela

Com s'identifica?

De mida mitjana, és extremadament estilitzat. Té les potes, i el bec molt llargs i prims. El seu cos és una combinació de 3 colors: negre a les ales, el bec i alguna part del cap i coll, vermell a les potes, i blanc a la resta del cos.

Quan el podem veure?

És un ocell estival que podem veure bàsicament de març a setembre.

On es veu?

Sobretot al riu Besòs i al tram baix del riu Congost. Durant la migració apareix irregularment a altres cursos d'aigua, com la riera de Caldes.

Comportament

S'alimenta de petits invertebrats aquàtics que captura de la superfície de l'aigua i zones entollades amb el seu fi i llarg bec. Començà a reproduir-se amb èxit a la conca del Besòs fa dues temporades. La importància de la reproducció dels cames llargues a la conca del Besòs recau en que a Catalunya nidifica de forma localitzada, i es coneixen pocs casos de nidificació a rius. És una au molt territorial que defensa el niu activament contra qualsevol intrús, inclosos els humans.



Foto: Pep Arcos

BERNAT PESCAIRE

(*Ardea cinerea*) Cast.: Garza real

Com s'identifica?

De mida gran i cos estilitzat. Les potes i el coll són molt llargs, i té un bec llarg i robust de tons groguencs i grisosos. El color general del seu cos és gris, especialment als joves. Els adults presenten parts blanques al coll i al cap, i en plomatge nupcial tenen el bec ataronjat.

Quan el podem veure?

Durant tot l'any, ja que una part de la colònia de cria de Barcelona s'alimenta a la conca del Besòs. Es poden arribar a veure més de 10 exemplars en els trams més adients.

On es veu?

A qualsevol tram fluvial o bassa que tingui amfibis, peixos o crancs de riu americans.

Comportament

Pesca a l'aguait tant als marges com a l'interior del riu. Pot capturar peixos de mida notable i preses tan sorprenents com el cabusset. Una bona part dels ocells que s'alimenten als rius de la conca dormen al Barcelonès, en canvi altres ho fan dins la conca. Alguns exemplars manifesten activitat nocturna i es poden observar pescant de nit.



Foto: Pere Tuset / Digital Natura

XIVITONA VULGAR

(*Actitis hypoleuca*) Cast.: Andarrios chico

Com s'identifica?

De mida petita i cos allargat. Té el bec més llarg que el corriol petit, i les potes són més aviat curtes i verdoses. Les parts superiors i bona part del pit són marrons, mentre que la resta de parts inferiors són blanques. Quan està posat se li veu un entrant blanc entre l'ala i el pit. En vol presenta una franja alar blanca i batega les ales amb una combinació de moviments espasmòdics i planejades.

Quan la podem veure?

Tot l'any. És rar detectar-la al juny perquè no es reprodueix a la conca del Besòs. Durant les migracions es poden veure desenes d'individus.

On es veu?

A qualsevol tram fluvial o bassa que tingui marges i zones entollades amb poca vegetació, tant fangosos com pedregosos.

Comportament

Mentre camina sondeja els llims fluvials amb el seu bec tàctil i, així, detecta els invertebrats aquàtics que formen part de la seva dieta. És el limícola que menys l'afecten les vores del rius transformades en escullera. Mou la cua amunt i avall amb freqüència.

MARTINET BLANC

(*Egretta garzetta*) Cast.: Garceta común

Com s'identifica?

De mida mitjana i cos estilitzat. Les potes i el coll són molt llargs i té el bec negre amb forma d'arpó. És de color blanc, i té les potes negres acabades en uns dits grocs. Porta el coll arreplegat quan vola i li sobresurten les potes del cos. En plomatge reproductor tenen llargues plomes ornamentals al clatell i al dors.

Quan el podem veure?

Durant tot l'any, però és més nombrós fora de l'època reproductora quan es poden veure grups de més de 10 exemplars.

On es veu?

A qualsevol tram fluvial o bassa tranquil·la que tingui amfibis, peixos o crancs de riu americans.

Comportament

Freqüenta la llera fluvial i els marges de les basses, on espera pacientment el pas de les seves preses que captura gràcies a un moviment molt ràpid que recorda a un arpó. Fora de l'època reproductora es pot veure a arbres o basses, quan es reuneixen per dormir juntament amb esplugabous, tot i que sempre en nombres més reduïts.



Foto: Pere Tuset / Digital Natura

CORRIOL PETIT

(*Charadrius dubius*) Cast.: Chorlitejo chico

Com s'identifica?

De mida petita i cos més aviat arrodonit. Té un bec rabassut i potes llargues de color carn. Presenta les parts inferiors blanques i les superiors marronoses. Els adults tenen un collar negre i una franja del mateix color al cap. En canvi, aquestes zones són marrons en els joves. L'anell ocular groc és un caràcter exclusiu d'aquest limícola.

Quan el podem veure?

És estival, bàsicament s'observa entre febrer i octubre. A partir de l'agost es poden veure grups de desenes d'individus en zones favorables.

On es veu?

A qualsevol tram fluvial de la plana amb poca cobertura vegetal, per exemple platges o illetes de sediments fluvials.

Comportament

Durant l'època de cria (març - juliol) és fàcil veure'l volant sobre el seu territori mentre emet el seu cant. Els polls caminen al poc de néixer i són difícils de veure pel seu plomatge mimètic. A més, pon els ous directament al terra, de manera que es recomana no caminar per les platges de còdols o de sorra per tal de no trepitjar els ous o els polls.



Foto: Pere Tuset / Digital Natura



Foto: Pere Tuset / Digital Natura

BLAUET

(*Alcedo atthis*) Cast.: Martín pescador

Com s'identifica?

Ocell petit i rabassut. Té el cap i el bec desproporcionadament més gran que la resta del cos. Els adults presenten l'esquena, cap i ales de color blau, i les parts davanteres de coloració ataronjada. Els joves són més verdosos, i de tonalitats més discretes. Vola molt ràpid, si veiem passar un petit llamp blavenc a tocar d'aigua segurament es tractarà d'un blauet.

Quan el podem veure?

És un ocell escàs i sempre s'observa en baix nombre, degut a la seva territorialitat. Als sectors de nidificació, principalment muntanyencs, és possible veure'l tot l'any. En canvi, a la regió planera resulta més fàcil observar-lo del juliol al març.

On es veu?

A qualsevol bassa, riera, torrent o riu de la conca del Besòs on hi hagin peixos petits.

Comportament

Passa molt desapercebut, tot i la vistositat del seu plomatge. Sol romandre posat als marges fluvials, a escassa distància de l'aigua, des d'on es llença en picat quan detecta les seves preses.



Foto: Pere Tuset / Digital Natura

XIVITA

(*Tringa ochropus*) Cast.: Andarrios grande

Com s'identifica?

És una mica més gran i de bec i potes més llargues que la xivitona. Té el ventre blanc que contrasta molt amb les parts superiors i el pit, que són d'un color més fosc que en l'espècie anterior. Quan vola es veu un contrast molt fort entre les ales, que no presenten cap franja blanca, i la cua i el ventre blancs.

Quan la podem veure?

Tot l'any. És rar detectar-la al maig perquè no es reprodueix a la conca del Besòs. Durant les migracions es poden veure grups de més de 10 exemplars.

On es veu?

A qualsevol tram fluvial o bassa que tingui vores amb poca pendent i sense gaire vegetació. Pot trobar-se en diferents tipus de platges, però té més predilecció per les zones entollades que la xivitona.

Comportament

S'alimenta d'invertebrats aquàtics i els busca d'igual manera que la xivitona, tot i que les potes i bec més llargs li permeten accedir a zones de major profunditat. És més sensible a la presència humana que la xivitona.



Habitat aquàtic. Riu Congost - La Garriga.

Amb la col·laboració de:
Aigües de Catalunya

Diputació de Barcelona
Xarxa de municipis

Consorci per a la gestió de la Conca del Besòs
Besòs



BLAUET

HÀBITAT AQUÀTIC II

ELS OCELLS DE LA CONCA DEL BESÒS

ELS OCELLS DE LA CONCA DEL BESÒS

HÀBITAT AQUÀTIC I

HÀBITAT AQUÀTIC II

BOSC DE RIBERA I

BOSC DE RIBERA II

HERBASSARS / CODOLARS I

HERBASSARS / CODOLARS II

ESPAI AERI

Consorci per a la gestió de la Conca del Besòs
Besòs


1. Esplugabous
2. Martinet blanc
3. Bernat pescaire
4. Blauet
5. Cames llargues
6. Corriol petit
7. Xivitona vulgar
8. Xivita



Riu Ripoll (Sabadell)
X 425445 Y 4602627
X 426360 Y 4601189
Distancia 2350 m.



Riera de Caldes / Hostal del Fum (Palau-solità i Plegamans)
X 431296 Y 4602426
X 431447 Y 4600085
Distancia 2450m.



Riu Congost / Parc Firal - Can Cabanyes (Granollers)
X 439815 Y 4604913
X 439175 Y 4602305
Distancia 2920m.



Riu Besòs / Parc fluvial del Besòs (Sant Adrià de Besòs)
X 435247 Y 4586383
X 435982 Y 4585827
Distancia 870 m.