

TITELLA
(*Anthus pratensis*) Cast.: Bisbita pratense

Com s'identifica?

De mida petita. Té un bec prim i punxegut. La part superior del cos és marronosa amb tons verdosos i un ratllat fosc. Les parts inferiors són pàl·lides amb un llistat fosc al pit i als flancs. Les potes son rosades.

Quan la podem veure?

És un hivernant comú que s'observa d'octubre a abril.

On es veu?

Principalment als herbassars i codolars dels marges fluvials, tot i que també es pot trobar fàcilment a zones entollades. Es distribueix per qualsevol sector de la conca on hi hagi un mínim d'espais oberts, però és més abundant als trams mitjans i baixos, on el llit fluvial és més ample.

Comportament

S'alimenta al terra, en ambients on la vegetació no sigui massa densa i alta. Examina el terreny pas a pas, sense donar salts, mentre busca els invertebrats. És gregària i sovint forma grups mixtos amb altres ocells. És la típica espècie que es reprodueix al centre i nord d'Europa i passa l'hivern al sud del continent, on troba unes condicions climàtiques més benignes.



Foto: Pere Tuset / DigitalNatura

PINSÀ COMÚ
(*Fringilla coelebs*) Cast.: Pinzón vulgar

Com s'identifica?

De mida i forma similar al pardal, però una mica més allargat. A més, té les plomes externes de la cua blanques i dues franges alars del mateix color molt visibles en vol. El mascle té el capell blavós i les parts inferiors rogenques, mentre que la femella és marronosa.

Quan el podem veure?

Tot l'any als sectors reproductors. Entre octubre i abril a tota la conca.

On es veu?

Durant l'època de nidificació es troba lligat als boscos humits de la conca. Durant la hivernada no es mostra tan depenent de la presència d'arbres i apareix a qualsevol tram amb codolars i vegetació baixa. De fet, és un dels ocells més abundants a l'hivern, ja que ens visiten molts individus del centre i nord d'Europa.

Comportament

És un ocell gregari fora de l'època reproductora que s'alimenta principalment al terra. És granívor, però quan nidifica també treu profit d'insectes i cucs. És una de les espècies perseguides pels "ocellaires", que els capturen pel seu cant bonic i potent.



Foto: José Antonio Calero

Autors: Francesc Xavier Macià i Xavier Larruy (Primavera 2009) / Disseny i realització : Estudi Calvet (679 665 520)



Amb la col·laboració de:

D'altra banda, una part de les espècies migratòries trien

el Besòs com a zona d'ivernada. Durant aquest període,

que transcorre bàsicament des de mitjans de novembre

a mitjans de febrer, s'allotgen a la conca centenars d'aus

aquàtiques procedents de zones situades més al nord.

Aquí troben una climatologia més benigne i, per tant,

una major disponibilitat de recursos per alimentar-se.

En aquesta època, tal i com passa durant la reproducció,

la distribució i l'abundància de cada espècie depen

dels seus requeriments, així com de l'estat ecològic de

cada tram.

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

Els trams mitjans i baixos de la conca del Besòs es

troben situats per a l'observació d'ocells migradors

per la seva proximitat al litoral, que és una via migratòria

molt important. Prova d'això és que s'hi han detectat

més de 200 espècies en la conca. Per mantenir aquesta

abundància d'aus és vital la presència de vegetació al

riu i al seu entorn per tal de proporcionar aliment i refugi

als ocells, sobretot a les zones properes al litoral on la

urbanització i la pressió humana és major.

HERBASSARS
I CODOLARS I




Punt d'observació




Punts o recorreguts per a la observació de les aus

Carretera principal
Carretera secundària
Itinerari a peu


1. Titella
2. Cotxa fumada
3. Bitxac comú
4. Trist
5. Pinsà comú
6. Gafarró
7. Verdum
8. Cadenera



Riu Tenes
(Lliça d' Amunt / Lliça de Vall)
X 437009 Y 4606926
X 437156 Y 4604659
Distancia 2.400m.



Riu Congost
(La Garriga / Les Franqueses del Vallès)
X 440572 Y 4613117
X 441379 Y 4611457
Distancia 2.000m.



Riera de Caldes
(Santa Perpètua de Mogoda)
X 431422 Y 4600041
X 432545 Y 4598213
Distancia 2.150m.



Riu Ripoll
(Montcada i Reixac)
X 431394 Y 4593427
X 429658 Y 4593869
Distancia 1.750m.

